

Maxiflox Colírio e pomada oftálmica

Ciprofloxacino

Antiinfecioso

Uso adulto

Composição

	Suspensão oftálmica	Pomada oftálmica
Ciprofloxacino base	3 mg	3mg
Excipiente estéril	q.s.p. 1 ml	q.s.p. 1 g
conservante	Cloreto de benzalcônio 0,006%	Clorobutanol 0,5%

Informação técnica

O ciprofloxacino é uma fluorquinolona antibacteriana de efeito rápido, que não apresenta resistência cruzada com as penicilinas, cefalosporinas, tetraciclina e aminoglicosídeos. Atua por inibição do DNA-girase bacteriano, interferindo na replicação do DNA.

Indicações

Infecções oculares causadas por microorganismos suscetíveis. Úlceras de córnea por *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus* (grupo Viridans). Conjuntivites por *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* e *Streptococcus pneumoniae*.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, ou a outros derivados quinolônicos.

Reações adversas

Mais comum: ardência local. Podem ocorrer formação de crostas na margem da pálpebra, sensação de corpo estranho, prurido, hiperemia conjuntival e mau gosto na boca após instilação.

Posologia

Colírio

Úlcera de córnea

Ao iniciar o tratamento: 2 gotas a cada 15 minutos durante as primeiras 6 horas.

No restante do dia, instilar 2 gotas a cada 30 minutos.

No segundo dia: 2 gotas a cada 30 minutos.

Do terceiro ao décimo quarto dia: 2 gotas a cada 4 horas.

O tratamento poderá continuar por mais de 14 dias, se não tiver ocorrido reepitelização da córnea.

Conjuntivite bacteriana

Instilar 1 ou 2 gotas a cada 2 horas durante os 2 primeiros dias de tratamento.

Instilar então, 1 ou 2 gotas a cada 4 horas, durante os 5 dias subsequentes.

Pomada oftálmica

Aplicar cerca de 1,5 cm da pomada no saco conjuntival inferior, 3 a 4 vezes por dia, ou a critério médico.

Para maior comodidade, o colírio poderá ser utilizado durante o dia e a pomada à noite, ao deitar-se.

Apresentação

Solução oftálmica estéril - frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml

Pomada oftálmica estéril - bisnaga com bico oftálmico contendo 3,5 g

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Maxiflox (ciprofloxacino): Reg. M.S. 1.1725.0023.001-2 = colírio de 5 ml e Reg. M.S. 1.1725.0023.002-0 = pomada de 3,5 g

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322