

visonest[®]

cloridrato de proximetacaína 0,5%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 5 mg de cloridrato de proximetacaína.

Veículo: glicerina, cloreto de benzalcônio, edetato dissódico e água purificada q.s.p.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação anestésica.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Este produto elimina a dor e também a sensibilidade natural do olho. Evite esfregar os olhos e proteja-os de poeira, fagulhas ou de qualquer outra agressão enquanto estiverem anestesiados. Procure o médico oftalmologista para que ele determine a causa da dor e possa estabelecer o tratamento adequado. O uso repetido de colírios anestésicos sem acompanhamento médico pode causar lesões oculares graves.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

A proximetacaína é um anestésico local, do tipo éster. Age por estabilização da membrana neuronal, inibindo a transmissão dos impulsos nervosos sensoriais.

O efeito anestésico se inicia em cerca de 30 segundos e permanece por 15 a 20 minutos.

Indicações

Anestesia do globo ocular em cirurgias, retirada de corpos estranhos corneanos e conjuntivais e procedimentos diagnósticos.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O produto deve ser usado pelo paciente somente sob supervisão médica.

Precauções e Advertências

O uso prolongado pode resultar em opacificação corneana, seguida de perda da visão, ou perfuração corneana.

O paciente deve ser avisado a não tocar os olhos enquanto estiver sob efeito da anestesia. Proteja os olhos de substâncias químicas irritantes e corpos estranhos.

Use com cautela nos pacientes com problemas cardíacos, hepáticos ou respiratórios, epilepsia, miastenia grave, portadores de afecções da glândula tireóide e pacientes com baixa concentração de colinesterase plasmática.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Reações Adversas

Ocasionalmente, podem ocorrer reações alérgicas locais. O uso prolongado pode danificar a córnea e retardar a cicatrização ocular.

Posologia

Para procedimentos de curta duração: instile 1 a 2 gotas no saco conjuntival, a critério médico.

Para anestesia prolongada: instile 1 a 2 gotas, a cada 5-10 minutos, em um total de 4 a 6 doses, a critério médico.

Superdosagem

Em caso de superdosagem deve-se instituir sem demora o tratamento sintomático adequado.

Pacientes Idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0058
Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer
CRF-SP nº 18.150



 **ALLERGAN**

Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

72142BR10X - Laetus: 165

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800-144077

Discagem Direta Gratuita